

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【大腸がん】
 レジメン名： IRIS+Bev(triweekly)併用 療法
 放射線治療併用： 【無】
 1コースの日数： 21 日

催吐リスク： 中等度リスク

【備考】

投与回数上限：
 術後補助 切除不能・再発
 有 回 有 回
 無 無 回

●S-1：BSA1.25m²未満 40mg/回，BSA1.25
 ~1.5m²未満 50mg/回，BSA1.5m²以上
 60mg/回
 ●ペバシズマブ投与時間：30~90分

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量		投与方法	投与時間	Day																				
		単位				分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	S-1	80~120	mg	内服		分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1
2	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓																				
3	生理食塩液 ペバシズマブ注射液	100 7.5	mL mg/kg	点滴静注 点滴静注		↓ ↓																				
4	生理食塩液 ホスアプレピタント注射液	100 150	mL mg	点滴静注 点滴静注	30分 30分	↓ ↓																				
5	パロノセトロン点滴静注0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75 4.95	mg mg	点滴静注 点滴静注	15分 15分	↓ ↓																				
6	5%糖液 イリノテカン注射液	500 150	mL mg/m ²	点滴静注 点滴静注	90分 90分	↓ ↓																				
7	センノシド	24	mg	内服		分1																				