

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種：【大腸がん】
 レジメン名：IRIS+Panitumumab併用療法
 放射線治療併用：【無】
 1コースの日数：28日

催吐リスク：中等度リスク

【備考】

投与回数上限：
 ■ 術後補助 ■ 切除不能・再発
 □ 有 回 □ 有 回
 □ 無 □ 無

●S-1：BSA1.25m²未満 40mg/回，BSA1.25～1.5m²未満 50mg/回，BSA1.5m²以上 60mg/回

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	S-1	80~120 mg	内服		分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1		
2	生理食塩液	250 mL	ルートキープ		↓																									↓		
3	生理食塩液 パニツムマブ注射液	100 mL 6 mg/kg	点滴静注 点滴静注	60分 60分	↓																									↓		
4	生理食塩液 ホスアプレビタント注射液	100 mL 150 mg	点滴静注 点滴静注	30分 30分	↓																									↓		
5	パロノセトン点滴静注0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75 mg 4.95 mg	点滴静注 点滴静注	15分 10分	↓																									↓		
6	5%糖液 イリノテカン注射液	500 mL 100 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	90分 90分	↓																									↓		
7	センノシド	24 mg	内服		↓																									↓		
8	ロコイドクリーム	1 本	外用		↓																											
9	ミノサイクリン錠	100 mg	内服		分1	分1	分1	分1	分1	分1																				分1	分1	