

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種：【大腸がん】
 レジメン名：IRIS 療法
 放射線治療併用：【無】
 1コースの日数：28 日

催吐リスク：中等度リスク

【備考】

投与回数上限：

術後補助 切除不能・再発
 有 回 有 回
 無 無

●S-1：BSA1.25m²未満 40mg/回，BSA1.25～1.5m²未満 50mg/回，BSA1.5m²以上 60mg/回

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	S-1	80~120 mg	内服		分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1		
2	生理食塩液	250 mL	ルートキープ		↓																									↓		
3	生理食塩液 ホスアプレピタント注射液	100 mL	点滴静注	30分	↓																									↓		
		150 mg	点滴静注	30分	↓																											
4	パロノセトロン点滴静注液0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75 mg	点滴静注	15分	↓																									↓		
		4.95 mg	点滴静注	15分	↓																										↓	
5	5%糖液 オキザリプラチン注射液	500 mL	点滴静注	90分	↓																									↓		
		100 mg/m ²	点滴静注	90分	↓																										↓	
6	センノシド	24 mg	内服		分1																									分1		