済生会和歌山病院　がん化学療法レジメン

がん種：【大腸がん】

レジメン名：Ramucirumab+FOLFIRI　療法

放射線治療併用：【無】

1コースの日数：14　日

催吐リスク：中等度リスク

投与回数上限：

■ 術後補助　□ 有　回　□ 無

■ 切除不能・再発　□ 有　回　□ 無

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量	単位	投与方法	投与時間 分	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg	50	mg	内服		分1													
2	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓													
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	30分	↓													
	ホスアプレピタント注射液	150	mg	点滴静注	30分	↓													
4	パロノセトロン点滴静注液0.75mg	0.75	mg	点滴静注	15分	↓													
	デキサメタゾン注射液3.3mg	4.95	mg	点滴静注	15分	↓													
	ファモチジン注射液20mg	20	mg	点滴静注	15分	↓													
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	60分	↓													
	ラムシルマブ注射液	8	mg/kg	点滴静注	60分	↓													
6	5%糖液	250	mL	点滴静注	120分	↓													
	レボホリナート注射液	200	mg/m2	点滴静注	120分	↓													
7	5%糖液	250	mL	点滴静注	120分	↓													
	イリノテカン注射液	150	mg/m2	点滴静注	120分	↓													
8	生理食塩液	50	mL	点滴静注	15分	↓													
	5-FU注	400	mg/m2	点滴静注	15分	↓													
9	生理食塩液	230	mL	持続		↓	↓												
	5-FU注	2400	mg/m2	持続		↓	↓												