

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【大腸がん】
 レジメン名： SOX+Bevacizumab 療法
 放射線治療併用： 【無】
 1コースの日数： 21 日

催吐リスク： 中等度リスク

【備考】

投与回数上限：

術後補助 切除不能・再発
 有 回 有 回
 無 無

●S-1：BSA1.25m²未満 40mg/回，BSA1.25～1.5m²未満 50mg/回，BSA1.5m²以上 60mg/回
 ●ベバシズマブ投与時間：30～90分

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	S-1	80~120 mg	内服		分1	分2	分1																		
2	デキサメタゾン錠	8 mg	内服		分2	分2																			
3	生理食塩液	250 mL	ルートキープ		↓																				
4	生理食塩液 ベバシズマブ注射液	100 mL 7.5 mg/kg	点滴静注 点滴静注		↓ ↓																				
5	パロノセトロン点滴静注液0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75 mg 6.6 mg	点滴静注 点滴静注	15分 15分	↓ ↓																				
6	5%糖液 デキサメタゾン注射液3.3mg オキサリプラチン注射液	500 mL 3.3 mg 130 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	120分 120分 120分	↓ ↓ ↓																				