

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【大腸がん】
 レジメン名： SOX 療法
 放射線治療併用： 【無】
 1コースの日数： 21 日

催吐リスク： 中等度リスク

【備考】

●S-1：BSA1.25m²未満 40mg/回，
 BSA1.25～1.5m²未満 50mg/回，BSA1.5m²
 以上 60mg/回

投与回数上限：
 術後補助 切除不能・再発
 有 8 回 有 回
 無 無

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量		投与方法	投与時間	Day																				
		単位				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	S-1	80~120	mg	内服		分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1			
2	デキサメタゾン錠	8	mg	内服		分2	分2																			
3	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓																				
4	パロノセトロン点滴静注液0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75	mg	点滴静注	15分	↓																				
		6.6	mg	点滴静注	15分	↓																				
5	5%糖液	500	mL	点滴静注	120分	↓																				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3.3	mg	点滴静注	120分	↓																				
	オキザリプラチン注射液	130	mg	点滴静注	120分	↓																				