

# 済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【大腸がん】  
 レジメン名： XELIRI 療法  
 放射線治療併用： 【無】  
 1コースの日数： 21 日

催吐リスク： 中等度リスク

投与回数上限：  
 術後補助       切除不能・再発  
 有 回       有 回  
 無       無

## 【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day																					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	カベスタビン錠	2000 mg/m2	内服		分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1			
2	センノシド	24 mg	内服		分1																					
3	ヒルドイドクリーム	2 本	外用		↓																					
4	ピリドキサル錠	3 錠	内服		分1	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分2			
5	生理食塩液	250 mL	ルートキープ		↓																					
6	生理食塩液	100 mL	点滴静注	30分	↓																					
	ホスアプレビタント注射液	150 mg	点滴静注	30分	↓																					
7	パロノセトロン点滴静注液0.75mg	0.75 mg	点滴静注	15分	↓																					
	デキサメタゾン注射液3.3mg	4.95 mg	点滴静注	15分	↓																					
8	生理食塩液	500 mL	点滴静注	90分	↓																					
	イリノテカン注射液	200 mg/m2	点滴静注	90分	↓																					