

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種:	【大腸がん】	
レジメン名:	XELOX	療法
放射線治療併用:	【無】	
1 コースの日数:	21	日

催吐リスク： 中等度リスク

投与回数上限：

☒ 術後補助	☒ 切除不能・再発
☒ 有 8 回	☐ 有 回
☐ 無	☒ 無

【レジメン内容】

No.	薬 剤 名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1	カベシタビン錠	2000 mg/m2	内服		分1 分2 分2 分2 分2 分2 分2 分2 分2 分2 分2 分2 分2 分2 分2 分2 分1
2	デキサメタゾン錠	8 mg	内服		分2 分2
3	ヒルドイドクリーム	2 本	外用		↓
4	ピリドキサル錠	3 錠	内服		分1 分3 分2
5	生理食塩液	250 mL	ルートキープ		↓
6	パロノセトロン点滴静注液0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75 mg	点滴静注	15分	↓
		6.6 mg	点滴静注	15分	↓
7	5%糖液 デキサメタゾン注射液3.3mg オキザリプラチン注射液	500 mL	点滴静注	120分	↓
		3.3 mg	点滴静注	120分	↓
		130 mg/m2	点滴静注	120分	↓