# 済生会和歌山病院　がん化学療法レジメン

がん種：【大腸がん】
レジメン名：IRIS+Cetuximab　療法
放射線治療併用：【無】
１コースの日数：28　日

催吐リスク：高度リスク

投与回数上限：
■ 術後補助　有　回　無
■ 切除不能・再発　有　回　無

【備考】
●S-1：BSA1.25m2未満 40mg/回，BSA1.25～1.5m2未満 50mg/回，BSA1.5m2以上 60mg/回
●セツキシマブ投与量：初回のみ400mg/m2

**【レジメン内容】**

| No. | 薬剤名 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | 投与時間 分 | Day 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg | 50 | mg | 内服 | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | |
| 2 | S-1 | 80～120 | mg | 内服 | | 分1 | 分2 | 分2 | 分2 | 分2 | 分2 | 分2 | 分2 | 分2 | 分2 | 分2 | 分2 | 分2 | 分2 | 分1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | センノシド | 2 | 錠 | 内服 | | 分1 | | | | | | | | | | | | | | 分1 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ロコイドクリーム | 1 | 本 | 外用 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ミノサイクリン錠 | 100 | mg | 内服 | | 分1 | 分1 | 分1 | 分1 | 分1 | | | | | | | | | | 分1 | 分1 | 分1 | 分1 | 分1 | | | | | | | | | |
| 6 | 生理食塩液 | 250 | mL | ルートキープ | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 7 | 生理食塩液 | 250 | mL | 点滴静注 | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | | ↓ | | | | | | |
| | セツキシマブ注射液 | 400 | mg/m2 | 点滴静注 | 120分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セツキシマブ注射液 | 250 | mg/m2 | 点滴静注 | 60分 | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 8 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| | ホスアプレピタント注射液 | 150 | mg | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | パロノセトロン点滴静注液0.75mg | 0.75 | mg | 点滴静注 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | 15分 | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| | デキサメタゾン注射液3.3mg | 4.95 | mg | 点滴静注 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| | ファモチジン注射液20mg | 20 | mg | 点滴静注 | 15分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 10 | 5%糖液 | 500 | mL | 点滴静注 | 90分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| | イリノテカン注射液 | 100 | mg/m2 | 点滴静注 | 90分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | |