

# 済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種: 大腸がん  
 レジメン名: Bevacizumab+FOLFIRI 療法  
 放射線治療併用: 【無】  
 1コースの日数: 14 日

催吐リスク: 中等度リスク

【備考】

投与回数上限:  
 術後補助       切除不能・再発  
 有 回       有 回  
 無       無

●ベバシズマブ投与時間：30～90分

## 【レジメン内容】

| No. | 薬剤名                                   | 標準投与量        |             | 投与方法         | 投与時間         | Day        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
|     |                                       | 単位           |             |              |              | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |
| 1   | 生理食塩液                                 | 250          | mL          | ルートキープ       |              | ↓          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 2   | 生理食塩液<br>ベバシズマブ注射液                    | 100<br>5     | mL<br>mg/kg | 点滴静注<br>点滴静注 |              | ↓<br>↓     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 3   | 生理食塩液<br>ホスアプレピタント注射液                 | 100<br>150   | mL<br>mg    | 点滴静注<br>点滴静注 | 30分<br>30分   | ↓<br>↓     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 4   | パロノセトロン点滴静注液0.75mg<br>デキサメタゾン注射液3.3mg | 0.75<br>4.95 | mg<br>mg    | 点滴静注<br>点滴静注 | 15分<br>15分   | ↓<br>↓     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 5   | 5%糖液<br>レボホリナート注射液                    | 250<br>200   | mL<br>mg/m2 | 点滴静注<br>点滴静注 | 120分<br>120分 | ↓<br>↓     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 6   | 5%糖液<br>イリノテカン注射液                     | 250<br>150   | mL<br>mg/m2 | 点滴静注<br>点滴静注 | 120分<br>120分 | ↓<br>↓     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 7   | 生理食塩液<br>5-FU注                        | 50<br>400    | mL<br>mg/m2 | 点滴静注<br>点滴静注 | 15分<br>15分   | ↓<br>↓     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 8   | 生理食塩液<br>5-FU注                        | 230<br>2400  | mL<br>mg/kg | 持続<br>持続     |              | ↓ ↓<br>↓ ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |