

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【大腸がん】
 レジメン名： Bevacizumab+mFOLFOX6 療法
 放射線治療併用： 【無】
 1コースの日数： 14 日

催吐リスク： 中等度リスク

【備考】

投与回数上限：

術後補助 切除不能・再発
 有 回 有 回
 無 無

●ベバシズマブ投与時間：30～90分

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生理食塩液	250 mL	ルートキープ		↓														
2	生理食塩液 ベバシズマブ注射液	100 mL 5 mg/kg	点滴静注 点滴静注		↓ ↓														
3	パロノセトロン点滴静注液0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75 mg 9.9 mg	点滴静注 点滴静注	15分 15分	↓ ↓														
4	5%糖液 レボホリナート注射液	500 mL 200 mg/m2	点滴静注 点滴静注	120分 120分	↓ ↓														
5	5%糖液 オキザリプラチン注射液	250 mL 85 mg/m2	点滴静注 点滴静注	120分 120分	↓ ↓														
6	生理食塩液 5-FU注	50 mL 400 mg/m2	点滴静注 点滴静注	15分 15分	↓ ↓														
7	生理食塩液 5-FU注	230 mL 2400 mg/m2	持続 持続		↓ ↓ ↓ ↓														
8	デキサメタゾン錠	8 mg	内服			↓ ↓													