

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【大腸がん】
 レジメン名： Capecitabine+Bevacizumab併用 療法
 放射線治療併用： 【無】
 1 コースの日数： 21 日

催吐リスク： 最小度リスク

【備考】

●ベバシズマブ投与時間：30～90分

投与回数上限：

術後補助 切除不能・再発
 有 回 有 回
 無 無

【レジメン内容】

| No. | 薬剤名 | 標準投与量 単位 | 投与方法 | 投与時間 分 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------------------|--------------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | カベンタビン錠 | 2000 mg/m ² | 内服 | | 分1 | 分2 | 分1 | | | |
| 2 | ヒルドイドクリーム | 2 本 | 外用 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ピドキサール錠 | 3 錠 | 内服 | | 分1 | 分3 | 分2 | | | |
| 4 | 生理食塩液 ベバシズマブ注射液 | 100 mL 7.5 mg/kg | 点滴静注 点滴静注 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |