

済生会和歌山病院

がん化学療法レジメン

がん種：

【大腸がん】

レジメン名：

Cetuximab+FOLFIRI

放射線治療併用：

【有】

1コースの日数：

14

日

催吐リスク：

中等度リスク

【備考】

●セツキシマブ投与量：初回のみ400mg/m²

投与回数上限：

■術後補助

■切除不能・再発

・有回

・有回

・無

・無

【レジメン内容】

No.	薬 剤 名	標準投与量		投与方法	投与時間	Day														
		単位	分			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg	50	mg	内服		分1										分1				
2	生理食塩液	250	mL	ルートキープ			↓									↓				
3	生理食塩液	250	mL	点滴静注			↓									↓				
	セツキシマブ注射液	400	mg/m2	点滴静注	120分		↓													
	セツキシマブ注射液	250	mg/m2	持続	60分											↓				
4	パロノセトロン点滴静注液0.75mg	0.75	mg	点滴静注	15分		↓													
	デキサメタゾン注射液3.3mg	4.95	mg	点滴静注	15分		↓													
	ファモチジン注射液20mg	20	mg	点滴静注	15分		↓									↓				
	生理食塩液	100	mL	点滴静注	15分											↓				
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	30分		↓													
	ホスアプレビタント注射液	150	mg	点滴静注	30分		↓													
6	5%糖液	250	mL	点滴静注	120分		↓													
	レボホリナート注射液	200	mg/m2	点滴静注	120分		↓													
7	5%糖液	250	mL	点滴静注	120分		↓													
	イリノテカン注射液	150	mg/m2	点滴静注	90分		↓													
8	生理食塩液	50	mL	点滴静注	15分		↓													
	5-FU注	400	mg/m2	点滴静注	15分		↓													
9	生理食塩液	230	mL	持続			↓ ↓													
	5-FU注	2400	mg/m2	持続			↓ ↓													
10	ロコイドクリーム	1	本	外用			↓													
11	ミノサイクリン錠	100	mg	内服			↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓													