済生会和歌山病院　がん化学療法レジメン

がん種：【大腸がん】
レジメン名：Cetuximab＋FOLFIRI　療法
放射線治療併用：【有】
1コースの日数：14　日

催吐リスク：高度リスク

投与回数上限：
■ 術後補助　有　回　無
■ 切除不能・再発　有　回　無

【備考】
●セツキシマブ投与量：初回のみ400mg/m^2

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量	単位	投与方法	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					分														
1	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg	50	mg	内服		分1							分1						
2	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓							↓						
3	生理食塩液	250	mL	点滴静注		↓							↓						
	セツキシマブ注射液	400	mg/m2	点滴静注	120分	↓													
	セツキシマブ注射液	250	mg/m2	持続	60分								↓						
4	パロノセトロン点滴静注液0.75mg	0.75	mg	点滴静注	15分	↓													
	デキサメタゾン注射液3.3mg	4.95	mg	点滴静注	15分	↓													
	ファモチジン注射液20mg	20	mg	点滴静注	15分	↓							↓						
	生理食塩液	100	mL	点滴静注	15分								↓						
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	30分	↓													
	ホスアプレピタント注射液	150	mg	点滴静注	30分	↓													
6	5%糖液	250	mL	点滴静注	120分	↓													
	レボホリナート注射液	200	mg/m2	点滴静注	120分	↓													
7	5%糖液	250	mL	点滴静注	120分	↓													
	イリノテカン注射液	150	mg/m2	点滴静注	90分	↓													
8	生理食塩液	50	mL	点滴静注	15分	↓													
	5-FU注	400	mg/m2	点滴静注	15分	↓													
9	生理食塩液	230	mL	持続		↓	↓												
	5-FU注	2400	mg/m2	持続		↓	↓												
10	ロコイドクリーム	1	本	外用		↓													
11	ミノサイクリン錠	100	mg	内服		↓	↓	↓	↓	↓									