

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【大腸がん】
 レジメン名： FOLFIRI 療法
 放射線治療併用： 【無】
 1コースの日数： 14 日

催吐リスク： 中等度リスク

投与回数上限：

<input checked="" type="checkbox"/> 術後補助	<input checked="" type="checkbox"/> 切除不能・再発
<input type="checkbox"/> 有 回	<input type="checkbox"/> 有 回
<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量		投与方法	投与時間	Day																			
		単位				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓																			
2	生理食塩液 ホスアプレピタント注射液	100	mL	点滴静注	60分	↓																			
		150	mg	点滴静注	60分	↓																			
3	パロノセトロン点滴静注液0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75	mg	点滴静注	15分	↓																			
		4.95	mg	点滴静注	15分	↓																			
4	5%糖液 レボホリナート注射液	250	mL	点滴静注	120分	↓																			
		200	mg/m ²	点滴静注	120分	↓																			
5	5%糖液 イリノテカン注射液	250	mL	点滴静注	120分	↓																			
		150	mg/m ²	点滴静注	120分	↓																			
6	生理食塩液 5-FU注	50	mL	点滴静注	15分	↓																			
		400	mg/m ²	点滴静注	15分	↓																			
7	生理食塩液 5-FU注	230	mL	持続		↓ ↓																			
		2400	mg/m ²	持続		↓ ↓																			