

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【悪性神経膠腫】
 レジメン名： Tmozolomide (維持) 療法
 放射線治療併用： 【無】
 1 コースの日数： 28 日

催吐リスク： 中等度リスク

投与回数上限：

<input type="checkbox"/> 術後補助	<input type="checkbox"/> 切除不能・再発
<input type="checkbox"/> 有 回	<input type="checkbox"/> 有 回
<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	注射用水	100 mL	ルートキープ		↓	↓	↓	↓	↓																							
2	パロノセトロン点滴静注液0.75mg	0.75 mg	点滴静注	15分	↓																											
	注射用水	100 mL	点滴静注	15分		↓	↓																									
	デキサメタゾン注射液3.3mg	9.9 mg	点滴静注	15分	↓	↓	↓																									
3	注射用水	500 mL	点滴静注	90分	↓	↓	↓	↓	↓																							
	テモゾロミド錠	150 mg/m2	点滴静注	90分	↓	↓	↓	↓	↓																							
4	5%糖液	100 mL	点滴静注	30分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
	バクタラミン注	1 管	点滴静注	30分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		