# 済生会和歌山病院　がん化学療法レジメン

がん種：【悪性神経膠腫】
レジメン名：Temozolomide（導入）　療法
放射線治療併用：【有】
１コースの日数：70　日

催吐リスク：中等度リスク

投与回数上限：
■ 術後補助　■ 切除不能・再発
▪ 有 1 回　▪ 有　回
▪ 無　▪ 無

**【レジメン内容】**

| No. | 薬剤名 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | 投与時間 | Day 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 分 | | | | |