

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種：
 レジメン名： EP 療法
 放射線治療併用： 【無】
 1コースの日数： 21 日

催吐リスク： 高度リスク

【備考】

●神経内分泌腫瘍

投与回数上限：
 ■ 術後補助 ■ 切除不能・再発
 □ 有 回 □ 有 回
 □ 無 □ 無

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	Day																					
					単位	分	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	オランザピン錠	5	mg	内服		分1	分1	分1	分1	分1																
2	ソルアセトF注	1500	mL	点滴静注		↓																				
3	生理食塩液	500	mL	点滴静注		↓	↓	↓																		
4	パロノセトロン点滴静注液0.75mg	0.75	mg	点滴静注	15分	↓																				
	5%糖液	100	mL	点滴静注	15分		↓	↓																		
	生理食塩液	100	mL	点滴静注	15分				↓																	
	デキサメタゾン注射液3.3mg	9.9	mg	点滴静注	15分	↓	↓	↓	↓																	
5	生理食塩液	500	mL	点滴静注	60分	↓																				
6	5%糖液	500	mL	点滴静注	120分	↓	↓	↓																		
	エトポシド注	100	mg/m2	点滴静注	120分	↓	↓	↓																		
7	生理食塩液	500	mL	点滴静注	90分	↓																				
	シスプラチン注	80	mg/m2	点滴静注	90分	↓																				
8	生理食塩液	50	mL	点滴静注	15分	↓																				
	フロセミド注	20	mg	点滴静注	15分	↓																				
9	ソルアセトF注	1500	mL	点滴静注	180分	↓																				
	ソルアセトF注	500	mL	点滴静注	60分		↓	↓																		
	ソルアセトF注	1000	mL	点滴静注	120分				↓																	