

# 濟生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【胃がん】  
 レジメン名： Capecitabine + HER併用 療法  
 放射線治療併用： 【無】  
 1 コースの日数： 21 日

催吐リスク： 最小度リスク

【備考】

初回：トラスツズマブ注8mg/kgを90分かけて投与

投与回数上限：

術後補助                       切除不能・再発  
 有                                       有                                      回  
 無                                       無

## 【レジメン内容】

No.	薬 剤 名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day																					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	カペシタビン錠	2000 mg/m <sup>2</sup>	内服		分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1			
2	ヒルドイドクリーム	2 本	外用		↓																					
3	ピリドキサル錠	3 錠	内服		分1	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分3	分2			
4	生理食塩液 トラスツズマブ注射液	250 mL 6 mg/kg	点滴静注 点滴静注	30分 30分	↓																					