

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【膵臓がん】
 レジメン名： GEM + Erlotinib併用 療法
 放射線治療併用： 【無】
 1コースの日数： 28 日

催吐リスク： 軽度リスク

投与回数上限：

<input checked="" type="checkbox"/> 術後補助	<input checked="" type="checkbox"/> 切除不能・再発
<input type="checkbox"/> 有 回	<input type="checkbox"/> 有 回
<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1	エルロチニブ錠	100 mg	内服		分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	
2	ミノサイクリン錠	100 mg	内服		分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1
3	ヒルドイドクリーム	1 本	外用		↓																															
4	ロコイドクリーム	1 本	外用		↓																															
5	生理食塩液	250 mL	ルートキープ		↓																															
6	生理食塩液 デキサメタゾン注射液3.3mg	100 mL 6.6 mg	点滴静注 点滴静注	15分	↓																															
				15分	↓																															
7	生理食塩液 ゲムシタビン注	100 mL 1000 mg/m2	点滴静注 点滴静注	30分	↓																															
				30分	↓																															