

済生会和歌山病院
 がん化学療法レジメン

がん種：
 臓器がん
 レジメン名：
 modifiedFOLFIRINOX
 療法
 放射線治療併用：
 無
 1コースの日数：
 14
 日

催吐リスク：
 高度リスク

投与回数上限：
 術後補助
 切除不能・再発
 有
 回
 無
 有
 回
 無

レジメン内容

No.	薬 剤 名	標準投与量		投与方法	投与時間	Day													
		単位				分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	デキサメタゾン錠	8	mg	内服		分2 分2 分2													
2	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓													
3	生理食塩液 ホスアプレビタント注射液	100	mL	点滴静注	30分	↓													
		150	mg	点滴静注	30分	↓													
4	パロノセトロン点滴静注液0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75	mg	点滴静注	15分	↓													
		9.9	mg	点滴静注	15分	↓													
5	5%糖液 オキザリプラチン注射液	250	mL	点滴静注	120分	↓													
		85	mg/m2	点滴静注	120分	↓													
6	5%糖液 レボホリナート注射液	250	mL	点滴静注	120分	↓													
		200	mg/m2	点滴静注	120分	↓													
7	5%糖液 イリノテカン注射液	250	mL	点滴静注	90分	↓													
		150	mg/m2	点滴静注	90分	↓													
8	生理食塩液 5-FU注	230	mL	持続		↓ ↓													
		2,400	mg/m2	持続		↓ ↓													
9	ベグフィルグラスチム皮下注	3.6	mg			↓													