



## 社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院 登録レジメン



### ◆悪性神経膠腫

更新日：2026/1/1

レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	最小度
レジメン名	Bevacizumab療法						
	アバステン (biweekly)	10mg/kg	点滴静注	day1	14		
	アバステン (triweekly)	15mg/kg	点滴静注	day1	21		
備考							
レジメン名	Temozolomide療法 テモゾロミド	150mg/m <sup>2</sup>	経口 or 点滴静注	day1-5	28	催吐リスク	軽度-中等度
備考							
RT併用時：75mg/m <sup>2</sup> 42日間投薬、28日間休薬。							

### ◆消化管間質腫瘍

更新日：2026/1/1

レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	最小度
	Imatinib療法 イマチニブ	400mg/body	経口	-	-	-	-
備考	KIT（CD117）陽性。1回400mgを1日1回夕食後内服。						
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	最小度
	Regorafenib療法 レゴラフェニブ	160mg/body	経口	-	-	-	-
備考	1回160mgを1日1回夕食後内服。						

### ◆MSI-High (固形癌)

更新日：2026/1/1

レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	最小度
レジメン名	Nivolumab療法 ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1	14		
	備考						
レジメン名	Pembrolizumab療法 ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	21	催吐リスク	最小度
	備考						

### ◆神経内分泌腫瘍

更新日：2026/1/1

レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	高度
レジメン名	EP療法						
	エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3	21		
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1			
備考							
腎機能注意。							

### ◆前立腺がん

更新日：2026/1/1

レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日
-------	-------	-----	------	-----

免責事項:本レジメ一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメ一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

レジメン名	ゴナックス皮下注用80mg(維持療法) デガレリクス	80mg/body	皮下注	day1	投与間隔	28	催吐リスク	-
備考								
レジメン名	ゾラデックス3.6mg <sup>g</sup> ホ ゴセレリン	3.6mg/body	皮下注	day1	投与間隔	28	催吐リスク	-
備考								
レジメン名	ゾラデックスLA10.8mg <sup>g</sup> ホ ゴセレリン	10.8mg/body	皮下注	day1	投与間隔	84	催吐リスク	-
備考								
レジメン名	リュープリンPRO注射用キット22.5 リュープロレリン	22.5mg/body	皮下注	day1	投与間隔	168	催吐リスク	-
備考								