

# 社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院 登録レジメン



## ◆非小細胞肺癌

更新日 : 2026/1/1

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	21	催吐リスク	中等度
レジメン名 CBDCA+PEM併用療法 カルボプラチニン ペメトレキセド	5AUC 500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	day1 day1				
<b>備考</b> CBDCA : 4クールまで。投与7日以上前から葉酸1日1回0.5内服、VB <sub>12</sub> 1mg筋注（3クール毎）。							
レジメン名 Osimertinib療法 オシメルチニブ	80mg/body	経口	-	投与間隔	-	催吐リスク	最小度
<b>備考</b>							
レジメン名 Pemetrexed単独療法 ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	投与間隔	21	催吐リスク	中等度
<b>備考</b> 投与7日以上前から葉酸1日1回0.5内服、VB121mg筋注（3クール毎）。							
レジメン名 Tepotinib療法 テポチニブ	500mg/body	経口	-	投与間隔	-	催吐リスク	最小度
<b>備考</b> MET陽性。							

## ◆小細胞肺癌

更新日 : 2026/1/1

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	21	催吐リスク	高度
レジメン名 CBDCA+ETP療法 カルボプラチニン エトボシド	5AUC 100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	day1 day1-3				
<b>備考</b>							
レジメン名 Durvalumab+CBDCA+ETP療法 デュルバルマブ カルボプラチニン エトボシド	1,500mg/body 5AUC 100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 点滴静注	day1 day1 day1-3	投与間隔	21	催吐リスク	高度
<b>備考</b> Dur : 体重30kg以下 20mg/kg。							
レジメン名 Durvalumab維持療法 デュルバルマブ	1,500mg/body	点滴静注	day1	投与間隔	21	催吐リスク	最小度
<b>備考</b> Dur : 体重30kg以下 20mg/kg。							