

社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院 登録レジメン



◆膀胱がん

更新日 : 2026/1/1

抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	28	催吐リスク	軽度
レジメン名 GEM+Erlotinib併用療法 エルロチニブ ゲムシタビン	100mg/body 1,000mg/m ²	経口 点滴静注	day1-28 day1, 8, 15				
備考							
レジメン名 GEM+S-1(隔日)併用療法 テガフル・ギメラシル・オテラシル ゲムシタビン	80mg/m ² 1,000mg/m ²	経口 点滴静注	隔日 day1, 8, 15				
備考							
レジメン名 GEM+S-1併用療法 テガフル・ギメラシル・オテラシル ゲムシタビン	80mg/m ² 1,000mg/m ²	経口 点滴静注	day1-14 day1, 8, 15				
備考							
レジメン名 GEM単独療法 ゲムシタビン	1,000mg/m ²	点滴静注	day1, 8, 15				
備考							
レジメン名 modifiedFOLFIRINOX療法 オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン 5-フルオロウラシル	85mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続静注 (46時間)	day1 day1 day1 day1				
備考							
レジメン名 nab-Paclitaxel+GEM併用療法 パクリタキセル (アルブミン懸濁型) ゲムシタビン	125mg/m ² 1,000mg/m ²	点滴静注 点滴静注	day1, 8, 15 day1, 8, 15				
備考							
レジメン名 nab-IRI+5-FU/I-LV療法 イリノテカン (リポソーム懸濁) レボホリナート 5-フルオロウラシル	70mg/m ² 200mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 持続静注 (46時間)	day1 day1 day1				
備考							