



## 社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院 登録レジメン



### ◆大腸がん

更新日：2026/9/7

| 抗がん薬名                                                                 | 投与量                    | 投与方法        | 投与日     | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 軽度  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------|------|----|-------|-----|
| <b>レジメン名</b> 5-FU/②-LV療法                                              |                        |             |         |      |    |       |     |
| レボホリナート                                                               | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| 5-フルオロウラシル                                                            | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注        | day1    |      |    |       |     |
| 5-フルオロウラシル                                                            | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注 (46時間) | day1    |      |    |       |     |
| <b>備考</b>                                                             |                        |             |         |      |    |       |     |
| <b>レジメン名</b> Afibercept+FOLFIRI療法                                     |                        |             |         | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 高度  |
| アフリベルセプト ペータ                                                          | 4mg/kg                 | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| レボホリナート                                                               | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| イリノテカン                                                                | 150mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| 5-フルオロウラシル                                                            | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注        | day1    |      |    |       |     |
| 5-フルオロウラシル                                                            | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注 (46時間) | day1    |      |    |       |     |
| <b>備考</b>                                                             |                        |             |         |      |    |       |     |
| <b>レジメン名</b> Bevacizumab+FOLFIRI療法                                    |                        |             |         | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 高度  |
| ベバシズマブ                                                                | 5mg/kg                 | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| レボホリナート                                                               | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| イリノテカン                                                                | 150mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| 5-フルオロウラシル                                                            | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注        | day1    |      |    |       |     |
| 5-フルオロウラシル                                                            | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注 (46時間) | day1    |      |    |       |     |
| <b>備考</b>                                                             |                        |             |         |      |    |       |     |
| <b>レジメン名</b> Bevacizumab+mFOLFOX6療法                                   |                        |             |         | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 中等度 |
| ベバシズマブ                                                                | 5mg/kg                 | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| レボホリナート                                                               | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| オキサリプラチン                                                              | 85mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| 5-フルオロウラシル                                                            | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注        | day1    |      |    |       |     |
| 5-フルオロウラシル                                                            | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注 (46時間) | day1    |      |    |       |     |
| <b>備考</b>                                                             |                        |             |         |      |    |       |     |
| <b>レジメン名</b> Bevacizumab単独療法                                          |                        |             |         | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 最小度 |
| ベバシズマブ                                                                | 5mg/kg                 | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| <b>備考</b>                                                             |                        |             |         |      |    |       |     |
| <b>レジメン名</b> Capecitabine+Bevacizumab併用療法                             |                        |             |         | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 最小度 |
| カペシタビン                                                                | 2,000mg/m <sup>2</sup> | 経口          | day1-14 |      |    |       |     |
| ベバシズマブ                                                                | 7.5mg/kg               | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| <b>備考</b> Cape：1回1,000mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝食後内服。day1夕からday15朝まで内服。 |                        |             |         |      |    |       |     |
| <b>レジメン名</b> Cetuximab+5-FU/②-LV療法                                    |                        |             |         | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 軽度  |
| セツキシマブ                                                                | 250mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1, 8 |      |    |       |     |
| レボホリナート                                                               | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |       |     |
| 5-フルオロウラシル                                                            | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注        | day1    |      |    |       |     |
| 5-フルオロウラシル                                                            | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注 (46時間) | day1    |      |    |       |     |

免責事項:本レジメ一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメ一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

|       |                                                                                                         |                        |            |         |  |      |    |       |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|--|------|----|-------|-----|
| 備考    | RAS遺伝子野生型。Cet：400mg/m <sup>2</sup> （初回）。                                                                |                        |            |         |  | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 軽度  |
| レジメン名 | Cetuximab+5-FU/LV療法                                                                                     |                        |            |         |  |      |    |       |     |
|       | セツキシマブ                                                                                                  | 500mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | レボホリナート                                                                                                 | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注（46時間） | day1    |  |      |    |       |     |
| 備考    | RAS遺伝子野生型。Interval：biweekly。                                                                            |                        |            |         |  | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 高度  |
| レジメン名 | Cetuximab+FOLFIRI療法                                                                                     |                        |            |         |  |      |    |       |     |
|       | セツキシマブ                                                                                                  | 250mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1, 8 |  |      |    |       |     |
|       | レボホリナート                                                                                                 | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | イリノテカン                                                                                                  | 150mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注（46時間） | day1    |  |      |    |       |     |
| 備考    | RAS遺伝子野生型。Cet：400mg/m <sup>2</sup> （初回）。                                                                |                        |            |         |  | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 高度  |
| レジメン名 | Cetuximab+FOLFIRI療法                                                                                     |                        |            |         |  |      |    |       |     |
|       | セツキシマブ                                                                                                  | 500mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | レボホリナート                                                                                                 | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | イリノテカン                                                                                                  | 150mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注（46時間） | day1    |  |      |    |       |     |
| 備考    | RAS遺伝子野生型。Interval：biweekly。                                                                            |                        |            |         |  | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 中等度 |
| レジメン名 | Cetuximab+mFOLFOX6療法                                                                                    |                        |            |         |  |      |    |       |     |
|       | セツキシマブ                                                                                                  | 250mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1, 8 |  |      |    |       |     |
|       | レボホリナート                                                                                                 | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | オキサリプラチン                                                                                                | 85mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注（46時間） | day1    |  |      |    |       |     |
| 備考    | RAS遺伝子野生型。Cet：400mg/m <sup>2</sup> （初回）。                                                                |                        |            |         |  | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 中等度 |
| レジメン名 | Cetuximab+mFOLFOX6療法                                                                                    |                        |            |         |  |      |    |       |     |
|       | セツキシマブ                                                                                                  | 500mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | レボホリナート                                                                                                 | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | オキサリプラチン                                                                                                | 85mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注（46時間） | day1    |  |      |    |       |     |
| 備考    | RAS遺伝子野生型。Interval：biweekly。                                                                            |                        |            |         |  | 投与間隔 | 7  | 催吐リスク | 最小度 |
| レジメン名 | Encorafenib+binimetinib+Cetuximab併用療法                                                                   |                        |            |         |  |      |    |       |     |
|       | エンコラフェニブ                                                                                                | 300mg/body             | 経口         | day1-7  |  |      |    |       |     |
|       | ビンメチニブ                                                                                                  | 90mg/body              | 経口         | day1-7  |  |      |    |       |     |
|       | セツキシマブ                                                                                                  | 250mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
| 備考    | RAS遺伝子野生型。Cet：400mg/m <sup>2</sup> （初回）。Enc：1回300mgを1日1回夕食後内服。Bin：1回45mgをday1夕からda8朝まで内服。BRAF（V600E）陽性。 |                        |            |         |  | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク | 中等度 |
| レジメン名 | Encorafenib+Cetuximab+mFOLFOX6療法                                                                        |                        |            |         |  |      |    |       |     |
|       | エンコラフェニブ                                                                                                | 300mg/body             | 経口         | day1-14 |  |      |    |       |     |
|       | セツキシマブ                                                                                                  | 250mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1, 8 |  |      |    |       |     |
|       | レボホリナート                                                                                                 | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | オキサリプラチン                                                                                                | 85mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注       | day1    |  |      |    |       |     |
|       | 5-フルオロウラシル                                                                                              | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注（46時間） | day1    |  |      |    |       |     |

|                                                                                        |                                  |                        |            |          |             |    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------|----|------------------|
| <b>備考</b> RAS遺伝子野生型。Cet：400mg/m <sup>2</sup> （初回）。Enc：1回300mgを1日1回夕食後内服。BRAF（V600E）陽性。 |                                  |                        |            |          |             |    |                  |
| <b>レジメン名</b>                                                                           | Encorafenib+Cetuximab+mFOLFOX6療法 |                        |            |          | <b>投与間隔</b> | 14 | <b>催吐リスク</b> 中等度 |
|                                                                                        | エンコラフェニブ                         | 300mg/body             | 経口         | day1-14  |             |    |                  |
|                                                                                        | セツキシマブ                           | 500mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1     |             |    |                  |
|                                                                                        | レボホリナート                          | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1     |             |    |                  |
|                                                                                        | オキサリプラチン                         | 85mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注       | day1     |             |    |                  |
|                                                                                        | 5-フルオロウラシル                       | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注       | day1     |             |    |                  |
|                                                                                        | 5-フルオロウラシル                       | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注（46時間） | day1     |             |    |                  |
| <b>備考</b> RAS遺伝子野生型。Interval：biweekly。Enc：1回300mgを1日1回夕食後内服。BRAF（V600E）陽性。             |                                  |                        |            |          |             |    |                  |
| <b>レジメン名</b>                                                                           | Encorafenib+Cetuximab併用療法        |                        |            |          | <b>投与間隔</b> | 7  | <b>催吐リスク</b> 最小度 |
|                                                                                        | エンコラフェニブ                         | 300mg/body             | 経口         | day1-7   |             |    |                  |
|                                                                                        | セツキシマブ                           | 250mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1     |             |    |                  |
| <b>備考</b> RAS遺伝子野生型。Cet：初回400mg/m <sup>2</sup> 。Enc：1回300mgを1日1回夕食後内服。BRAF（V600E）陽性。   |                                  |                        |            |          |             |    |                  |
| <b>レジメン名</b>                                                                           | FOLFIRI療法                        |                        |            |          | <b>投与間隔</b> | 14 | <b>催吐リスク</b> 高度  |
|                                                                                        | レボホリナート                          | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1     |             |    |                  |
|                                                                                        | イリノテカン                           | 150mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1     |             |    |                  |
|                                                                                        | 5-フルオロウラシル                       | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注       | day1     |             |    |                  |
|                                                                                        | 5-フルオロウラシル                       | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注（46時間） | day1     |             |    |                  |
| <b>備考</b>                                                                              |                                  |                        |            |          |             |    |                  |
| <b>レジメン名</b>                                                                           | Fruquintinib療法                   |                        |            |          | <b>投与間隔</b> | 28 | <b>催吐リスク</b> 最小度 |
|                                                                                        | フルキンチニブ                          | 5mg/body               | 経口         | day1-21  |             |    |                  |
| <b>備考</b> Fru：1回3mgを1日1回夕食後内服。Reg又はTF/TDのいずれの治療歴もない患者では、これらの薬剤による治療が困難な患者を対象。          |                                  |                        |            |          |             |    |                  |
| <b>レジメン名</b>                                                                           | IRIS+Panitumumab療法               |                        |            |          | <b>投与間隔</b> | 28 | <b>催吐リスク</b> 高度  |
|                                                                                        | テガフル・ギメラシル・オテラシル                 | 80mg/m <sup>2</sup>    | 経口         | day1-14  |             |    |                  |
|                                                                                        | イリノテカン                           | 100mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1, 15 |             |    |                  |
|                                                                                        | パニツムマブ                           | 6mg/kg                 | 点滴静注       | day1, 15 |             |    |                  |
| <b>備考</b> RAS遺伝子野生型。S-1：1回40mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝夕食後内服。day1夕からday15朝まで内服。           |                                  |                        |            |          |             |    |                  |
| <b>レジメン名</b>                                                                           | IRIS療法                           |                        |            |          | <b>投与間隔</b> | 28 | <b>催吐リスク</b> 高度  |
|                                                                                        | テガフル・ギメラシル・オテラシル                 | 80mg/m <sup>2</sup>    | 経口         | day1-14  |             |    |                  |
|                                                                                        | イリノテカン                           | 100mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1, 15 |             |    |                  |
| <b>備考</b> S-1：1回40mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝夕食後内服。day1夕からday15朝まで内服。                     |                                  |                        |            |          |             |    |                  |
| <b>レジメン名</b>                                                                           | mFOLFOX6療法                       |                        |            |          | <b>投与間隔</b> | 14 | <b>催吐リスク</b> 中等度 |
|                                                                                        | レボホリナート                          | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注       | day1     |             |    |                  |
|                                                                                        | オキサリプラチン                         | 85mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注       | day1     |             |    |                  |
|                                                                                        | 5-フルオロウラシル                       | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注       | day1     |             |    |                  |
|                                                                                        | 5-フルオロウラシル                       | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注（46時間） | day1     |             |    |                  |
| <b>備考</b>                                                                              |                                  |                        |            |          |             |    |                  |
| <b>レジメン名</b>                                                                           | Nivolumab+Ipilimumab併用療法         |                        |            |          | <b>投与間隔</b> | 42 | <b>催吐リスク</b> 最小度 |
|                                                                                        | ニボルマブ                            | 360mg/body             | 点滴静注       | day1, 22 |             |    |                  |
|                                                                                        | イピリムマブ                           | 1mg/kg                 | 点滴静注       | day1     |             |    |                  |
| <b>備考</b> MSI-High。                                                                    |                                  |                        |            |          |             |    |                  |
| <b>レジメン名</b>                                                                           | Nivolumab療法                      |                        |            |          | <b>投与間隔</b> | 14 | <b>催吐リスク</b> 最小度 |
|                                                                                        | ニボルマブ                            | 240mg/body             | 点滴静注       | day1     |             |    |                  |

免責事項:本レジメン一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

|       |                                       |                        |             |         |      |    |           |
|-------|---------------------------------------|------------------------|-------------|---------|------|----|-----------|
| 備考    | MSI-High。                             |                        |             |         |      |    |           |
| レジメン名 | Panitumumab+5-FU/LV療法                 |                        |             |         | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク 軽度  |
|       | パニツムマブ                                | 6mg/kg                 | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | レボホリナート                               | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | 5-フルオロウラシル                            | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注        | day1    |      |    |           |
|       | 5-フルオロウラシル                            | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注 (46時間) | day1    |      |    |           |
| 備考    | RAS遺伝子野生型。                            |                        |             |         |      |    |           |
| レジメン名 | Panitumumab+FOLFIRI療法                 |                        |             |         | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク 高度  |
|       | パニツムマブ                                | 6mg/kg                 | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | レボホリナート                               | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | イリノテカン                                | 150mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | 5-フルオロウラシル                            | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注        | day1    |      |    |           |
|       | 5-フルオロウラシル                            | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注 (46時間) | day1    |      |    |           |
| 備考    | RAS遺伝子野生型                             |                        |             |         |      |    |           |
| レジメン名 | Panitumumab+mFOLFOX6療法                |                        |             |         | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク 中等度 |
|       | パニツムマブ                                | 6mg/kg                 | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | レボホリナート                               | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | オキサリプラチン                              | 85mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | 5-フルオロウラシル                            | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注        | day1    |      |    |           |
|       | 5-フルオロウラシル                            | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注 (46時間) | day1    |      |    |           |
| 備考    | RAS遺伝子野生型                             |                        |             |         |      |    |           |
| レジメン名 | Panitumumab単独療法                       |                        |             |         | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク 最小度 |
|       | パニツムマブ                                | 6mg/kg                 | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
| 備考    | RAS遺伝子野生型                             |                        |             |         |      |    |           |
| レジメン名 | Pembrolizumab療法                       |                        |             |         | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク 最小度 |
|       | ペムブロリズマブ                              | 200mg/body             | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
| 備考    | MSI-High。                             |                        |             |         |      |    |           |
| レジメン名 | Ramucirumab+FOLFIRI療法                 |                        |             |         | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク 高度  |
|       | ラムシルマブ                                | 8mg/kg                 | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | レボホリナート                               | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | イリノテカン                                | 150mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | 5-フルオロウラシル                            | 400mg/m <sup>2</sup>   | 急速静注        | day1    |      |    |           |
|       | 5-フルオロウラシル                            | 2,400mg/m <sup>2</sup> | 持続静注 (46時間) | day1    |      |    |           |
| 備考    | Ram: 忍容性良好時、2回目は30分に投与時間短縮可能。         |                        |             |         |      |    |           |
| レジメン名 | Regorafenib療法                         |                        |             |         | 投与間隔 | 28 | 催吐リスク 最小度 |
|       | レゴラフェニブ                               | 160mg/body             | 経口          | day1-21 |      |    |           |
| 備考    | Reg: 1回160mgを1日1回夕食後内服。               |                        |             |         |      |    |           |
| レジメン名 | Sotorasib+Panitumumab併用療法             |                        |             |         | 投与間隔 | 14 | 催吐リスク 最小度 |
|       | ソトラシブ                                 | 960mg/body             | 経口          | day1-14 |      |    |           |
|       | パニツムマブ                                | 6mg/kg                 | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
| 備考    | Sot: 1回960mgを1日1回夕食後内服。KRAS G12C変異陽性。 |                        |             |         |      |    |           |
| レジメン名 | SOX+Bevacizumab併用療法                   |                        |             |         | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク 中等度 |
|       | テガフル・ギメラシル・オテラシル                      | 80mg/m <sup>2</sup>    | 経口          | day1-14 |      |    |           |
|       | ベバシズマブ                                | 7.5mg/kg               | 点滴静注        | day1    |      |    |           |
|       | オキサリプラチン                              | 130mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注        | day1    |      |    |           |

|       |                                                                         |                                                            |                    |                                |      |    |       |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------|----|-------|-----|
| 備考    | S-1：1回40mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝夕食後内服。day1タからday15朝まで内服。                |                                                            |                    |                                |      |    |       |     |
| レジメン名 | S0X療法                                                                   |                                                            |                    |                                | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
|       | テガフル・ギメラシル・オテラシル<br>オキサリプラチン                                            | 80mg/m <sup>2</sup><br>130mg/m <sup>2</sup>                | 経口<br>点滴静注         | day1-14<br>点滴静注                |      |    |       |     |
| 備考    | S-1：1回40mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝夕食後内服。day1タからday15朝まで内服。                |                                                            |                    |                                |      |    |       |     |
| レジメン名 | Trastuzumab+Pertuzumab併用療法                                              |                                                            |                    |                                | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 最小度 |
|       | ペルツズマブ<br>トラスツズマブ                                                       | 420mg/body<br>6mg/kg                                       | 点滴静注<br>点滴静注       | day1<br>day1                   |      |    |       |     |
| 備考    | HER2陽性。Per：840mg/body（初回）。Trs：8mg/kg（初回）。                               |                                                            |                    |                                |      |    |       |     |
| レジメン名 | TAS-102+Bevacizumab併用療法                                                 |                                                            |                    |                                | 投与間隔 | 28 | 催吐リスク | 最小度 |
|       | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩<br>ペバシズマブ                                              | 70mg/m <sup>2</sup><br>5mg/kg                              | 経口<br>点滴静注         | day1-5, day8-12<br>day1, 15    |      |    |       |     |
| 備考    | TF/TD：1回35mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝夕食後内服。day1タから内服開始、day13朝服用で終了。        |                                                            |                    |                                |      |    |       |     |
| レジメン名 | TAS-102療法                                                               |                                                            |                    |                                | 投与間隔 | 28 | 催吐リスク | 最小度 |
|       | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩                                                        | 70mg/m <sup>2</sup>                                        | 経口                 | day1-5, day8-12                |      |    |       |     |
| 備考    | TF/TD：1回35mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝夕食後内服。day1タから内服開始、day13朝服用で終了。        |                                                            |                    |                                |      |    |       |     |
| レジメン名 | UFT/UZEL+Bevacizumab併用療法                                                |                                                            |                    |                                | 投与間隔 | 28 | 催吐リスク | 最小度 |
|       | ユーエフティ<br>ユーゼル<br>アバステン                                                 | 300mg/m <sup>2</sup><br>75mg/body<br>5mg/kg                | 経口<br>経口<br>点滴静注   | day1-21<br>day1-21<br>day1, 15 |      |    |       |     |
| 備考    | UFT/UZEL：1回100mg/m <sup>2</sup> +25mgを1日3回朝昼夕食後2時間内服。day1タからday22昼まで内服。 |                                                            |                    |                                |      |    |       |     |
| レジメン名 | UFT/UZEL療法                                                              |                                                            |                    |                                | 投与間隔 | 35 | 催吐リスク | 最小度 |
|       | ユーエフティ<br>ユーゼル                                                          | 300mg/m <sup>2</sup><br>75mg/body                          | 経口<br>経口           | day1-28<br>day1-28             |      |    |       |     |
| 備考    | UFT/UZEL：1回100mg/m <sup>2</sup> +25mgを1日3回朝昼夕食後2時間内服。day1タからday28昼まで内服。 |                                                            |                    |                                |      |    |       |     |
| レジメン名 | XELIRI+Bevacizumab療法                                                    |                                                            |                    |                                | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 高度  |
|       | カペシタビン<br>ペバシズマブ<br>イリノテカン                                              | 1,600mg/m <sup>2</sup><br>7.5mg/kg<br>200mg/m <sup>2</sup> | 経口<br>点滴静注<br>点滴静注 | day1-14<br>day1<br>day1        |      |    |       |     |
| 備考    | Cape：1回800mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝夕食後内服。day1タからday15朝まで内服。              |                                                            |                    |                                |      |    |       |     |
| レジメン名 | XELIRI療法                                                                |                                                            |                    |                                | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 高度  |
|       | カペシタビン<br>イリノテカン                                                        | 1,600mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup>             | 経口<br>点滴静注         | day1-14<br>day1                |      |    |       |     |
| 備考    | Cape：1回800mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝夕食後内服。day1タからday15朝まで内服。              |                                                            |                    |                                |      |    |       |     |
| レジメン名 | XELOX+Bevacizumab療法(大腸)                                                 |                                                            |                    |                                | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
|       | カペシタビン<br>ペバシズマブ<br>オキサリプラチン                                            | 2,000mg/m <sup>2</sup><br>7.5mg/kg<br>130mg/m <sup>2</sup> | 経口<br>点滴静注<br>点滴静注 | day1-14<br>day1<br>day1        |      |    |       |     |
| 備考    | Cape：1回1,000mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝夕食後内服。day1タからday15朝まで内服。            |                                                            |                    |                                |      |    |       |     |
| レジメン名 | XELOX療法                                                                 |                                                            |                    |                                | 投与間隔 | 21 | 催吐リスク | 中等度 |
|       | カペシタビン<br>オキサリプラチン                                                      | 2,000mg/m <sup>2</sup><br>130mg/m <sup>2</sup>             | 経口<br>点滴静注         | day1-14<br>day1                |      |    |       |     |

免責事項:本レジメ一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメ一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

**備考** Cape : 1 回1,000mg/m<sup>2</sup>を1日2回朝夕食後内服。day1夕からday15朝まで内服。

---